

XXXV CONGRESO SECA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CALIDAD ASISTENCIAL

XIX JORNADAS SCQA
SOCIETAT CATALANA DE QUALITAT ASSISTENCIAL



ADECUACIÓN
Y EFICIENCIA
“MENOS ES MÁS”



PALACIO DE CONGRESOS

TARRAGONA

18, 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2017

Frecuencia y causas de la sobreutilización innecesaria de pruebas y procedimientos en atención primaria

Carrillo I, Vitaller J, Pérez-Pérez P, Silvestre C, Nebot C, Mira JJ, en nombre del
Grupo de Investigación SOBRINA

Proyecto financiado por el Fondo de Investigación en Salud y Fondos FEDER (referencia PI16/00816)

¿Qué es?

Prestación de una asistencia sanitaria en ausencia de evidencia o cuando el beneficio del tratamiento no supera sus riesgos.

SOBRECOSTES

**RIESGOS PARA
EL PACIENTE**

SOBREUTILIZACIÓN

OVERUSE

OVERDIAGNOSIS

OVERMEDICALIZATION

LOW VALUE CARE

¿Qué buscamos?

Determinar, bajo el punto de vista de profesionales de atención primaria, la frecuencia con la que se produce la sobreutilización innecesaria y los perfiles de pacientes que contribuyen a esta sobreutilización.

¿Cómo?

- ▶ Estudio multicéntrico observacional de corte transversal.
- ▶ Encuesta online basada en el instrumento del estudio de la ABIM Foundation (2014).
- ▶ Población de estudio: profesionales de medicina, pediatría y enfermería de atención primaria (AP).
- ▶ Invitación a partir de servicios autonómicos de salud, colegios y sociedades profesionales.

¿Cómo?


- ▶ Periodo de estudio: marzo – julio 2017.
- ▶ Variables: frecuencia prescripción, pruebas más solicitadas, perfil del paciente, responsabilidad y causas.
- ▶ Análisis descriptivos.

¿Con qué resultados?

▶ PARTICIPANTES


1.816 profesionales sanitarios del sistema público de salud

Enfermeros/as



Médicos/as

Mujer




Hombre

Pediatras


¿Con qué resultados?

► ¿CON QUÉ FRECUENCIA INDICA PRUEBAS O PROCEDIMIENTOS INNECESARIOS CASI TODOS LOS DÍAS?




ENFERMEROS/AS



PEDIATRAS



MÉDICOS/AS



¿Con qué resultados?

- ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES PETICIONES DE LOS PACIENTES LIGADAS A SOBREUTILIZACIÓN INNECESARIA?

ENFERMEROS/AS

1. Toma de constantes 78,7% (225)
2. Realización de curas que no requieren de profesionales 61,2% (175)

MÉDICOS/AS

1. Analíticas rutinarias de chequeo 76,8% (685)
2. Derivaciones a especialistas 67,6% (603)

PEDIATRAS

1. Analíticas rutinarias de chequeo 75,1% (479)
2. Administración de antibióticos 72,9% (465)

%(n)

¿Con qué resultados?

► ¿QUÉ PERFIL DE PACIENTE SOLICITA MÁS PRUEBAS O PROCEDIMIENTOS INECESARIOS?



64,7%

1.175

ENFERMEROS/AS

MÁS DE 66 AÑOS 55,2% (158)



ENFERMEROS/AS

Varias condiciones crónicas 53,8% (154)

MÉDICOS/AS

51 AÑOS O MÁS 44,2% (394)



MÉDICOS/AS

Enfermedad de baja prevalencia 32,8% (293)

PEDIATRAS

ENTRE 31 Y 50 AÑOS 63,9% (408)



PEDIATRAS

Enfermedad inespecífica 54,5% (348)

Conclusiones

- ▶ La sobreutilización representa un reto para la sostenibilidad de los sistemas sanitarios y la seguridad clínica.
- ▶ Los médicos y pediatras de atención primaria, en su rol de gatekeeper del sistema, no reducen la sobreutilización.
- ▶ Los pacientes juegan un rol importante en esta problemática.
- ▶ Es necesario llevar a cabo actividades de concienciación no solo dirigidas a la comunidad profesional, sino también a los usuarios del sistema sanitario y a los mass media.